

사용 설명서

수이샷® 이+파보 (SuiShot® e+Parvo)

1. 원료약품 및 분량 (본제 1두분 중)

- 가. 유효성분
 - ° *Erysipelothrix rhusiopathiae*-----40,000,000,000 CFU 이상
 - ° Porcine parvovirus VP2 단백질-----10,000 HA unit
- 나. 면역증강제
 - ° Immulant-α-----25%
- 다. 보존제
 - ° 포르말린(Formalin, KVP) -----0.2%

2. 제형 및 성상

- 가. 제형 : 생물학적 제제
- 나. 성상 : 노란백색의 수성현탁주사액으로 정치하면 백신 내용물의 침전이 생기나 흔들면 쉽게 균등액이 되며, 이물 및 이취가 없고 내용물의 성상이 균일함

3. 효능 및 효과

돼지의 단독 및 파보바이러스 감염증의 예방을 목적으로 사용

4. 용법 및 용량

- 가. 접종시기
 - 1) 후보돈 면역
 - 1차 접종 : 종부 4주전, 2차 접종 : 종부 2주전
 - 2) 경산돈 면역
 - 매 종부 2주전
 - 3) 웅돈
 - 선발직후 2주 간격으로 2회 접종 후, 매년 1회 보강접종
- 나. 접종방법
 - 2.0㎖씩 이근부 근육

5. 포장단위

5두/병

6. 저장방법 및 유효기간

- 가. 저장방법 : 냉장소(2-8℃)에 보관
- 나. 용기종류 : 밀봉용기
- 다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

- 가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것
대상동물이 중대한 질병과 관련된 경우, 백신접종을 피하십시오.
- 나. 다음 환축에게는 신중히 투여할 것
 - 1) 가벼운 발열, 설사 등의 이상증상이 확인된 것.
 - 2) 질병치료 중이거나 치료 직후 시간적 간격이 부족한 경우.
 - 3) 뚜렷한 영양장애가 있는 경우.
- 다. 부작용
 - 1) 주사 후 일과성의 발열, 원기소실, 식욕부진을 나타낼 수 있지만, 통상 3일 내에 회복됩니다.
 - 2) 주사 후 60일 이내에는 주사부위에 반흔이 남아있을 수 있으므로 출하 90일 이내의 돼지에는 접종하지 마십시오.
- 라. 일반적 주의
 - 1) 반드시 건강한 돼지에만 접종하십시오.
 - 2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
 - 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.
 - 4) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
 - 5) 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
 - 6) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신 연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 마. 적용상의 주의
 - 1) 백신을 사용 전에 충분히 흔들어 내용액을 균일하게 한 후 사용하십시오.
 - 2) 사용 전, 본 백신을 약 25℃전후가 되도록 하여 사용하십시오.
 - 3) 멸균된 주사기구를 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
 - 4) 백신 접종시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.
 - 5) 백신 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으로 소독하여 건조한 후 주사액을 뽑으며 주사시 혈관에 들어가지 않도록 주의하십시오.
 - 6) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은 백신은 잡균의 혼입, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
 - 7) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수 있어 즉시 백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다. 라벨, 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 외과의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받으십시오.
 - 8) 백신접종 후 적어도 1~2일간은 안정시키고 이동이나 심한 운동을 피하십시오.
- 바. 저장상 주의사항
 - 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
 - 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
 - 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.
 - 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
 - 5) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

SI-179D-01