

사용 설명서

수이샷® 돼지열병 (SuiShot® CSF-Live)

1. 원료약품 및 분량(본제 1두분 중)

가. 유효성분

° 돼지 열병바이러스 조직배양 세포배양 감염액(CSFV, LOM주)
.....10^{3.0}TCID₅₀이상

나. 첨가제

° 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨, L-글루탐산나트륨, 젤라틴, 주사용수(용제)

다. 용제

° 염화나트륨, 염화칼륨, 인산수소나트륨, 인산이수소칼륨, 정제수

2. 제형 및 성상

생물학적제제, 회백색의 건조괴이며 용해용액에 쉽게 용해되어 균일한 혼탁액이 되며 조직입자와 이물이 없고 소분된 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

3. 효능 및 효과

돼지열병의 예방

4. 용법 및 용량

가. 접종시기

1) 자돈 : 1차 40일령 (5~6주령),

2차 60일령 (8~9주령)

2) 번식돈(모돈·웅돈) : 매년 1회

나. 접종방법

1) 용제로 희석하여, 1mL씩 근육 접종한다.

2) 농장의 여건에 따라 자돈 접종법외에 초유 전 예방접종법(신생 자돈이 첫 젖을 먹기 전 접종)을 적용할 수 있다.

5. 포장단위

20두/병

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소(2~8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

1) 대상동물이 중대한 질병과 관련된 경우, 백신접종을 피하십시오.

2) 임신돈에는 접종하지 마십시오.

나. 다음 환축에게는 신중히 투여할 것

1) 가벼운 발열, 설사 등의 이상증상이 확인된 것.

2) 질병치료 중이거나 치료 직후 시간적 간격이 부족한 경우.

3) 뚜렷한 영양장애가 있는 경우.

4) 면역된 모돈에서 분만된 자돈은 이행항체의 영향으로 백신접종 후 면역이 성립 되지 않을 경우가 있으므로, 수의사의 지시를 받으십시오.

다. 부작용

1) 주사 후 일과성의 발열, 원기소실, 식욕부진을 나타낼 수 있습니다.

2) 주사 후 14일 이내에는 주사부위에 반흔이 남아있을 수 있으므로 출하 14일 이내의 돼지에는 접종하지 마십시오.

라. 일반적 주의

1) 반드시 건강한 돼지에만 접종하십시오.

2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.

4) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.

5) 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.

6) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신 연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

마. 적용상의 주의

1) 사용 전에 백신을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.

2) 멸균된 주사기구를 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.

3) 백신 접종시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.

4) 희석액과 백신액을 뽑을 때, 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으로 소독하여 건조한 후 뽑으며 주사시 혈관에 들어가지 않도록 주의하십시오.

5) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은 백신은 잡균의 혼입, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

6) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수 있어 즉시 백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다. 라벨, 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 외과의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받으십시오.

7) 백신접종 후 적어도 1~2일간은 안정시키고 이동이나 심한 운동을 피하십시오.

8) 예방약 접종시 피하지방 조직에 접종하면 면역이 성립되지 않습니다.

9) 생독 예방약이므로 예방약 병과 주사부위 과잉 소독을 피하십시오.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

SI-036G-02

바. 저장상 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 5) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.