

# 포울샷® ING-Plus

IB 2종(M41, KM91)+ND+IBD  
혼합 사독 오일백신

POULTRY  
VACCINE1000  
수분/병

PoulShot®

- 제품명 : 포울샷® 아이엔지-플러스 (PoulShot® ING-Plus)
- 원료약품 및 분량 (본제 1수분 중)
- 가. 유효성분
  - 불활화전 달 전염성기관자염 바이러스액 (IBV, M41주) ..... 10<sup>6.5</sup> EID<sub>50</sub> 이상
  - 불활화전 달 전염성기관자염 바이러스액 (IBV, KM91주) ..... 10<sup>6.5</sup> EID<sub>50</sub> 이상
  - 불활화전 뉴캐슬병 바이러스액 (NDV, LaSota주) ..... 10<sup>8.4</sup> EID<sub>50</sub> 이상
  - 불활화전 감보로병 바이러스액 (IBDV, CAG주) ..... 10<sup>6.4</sup> TCID<sub>50</sub> 이상
- 나. 면역증강제
  - Montanide ISA 70 ..... 70%
- 다. 보존제
  - Formalin ..... 0.2% 이하
- 제형 및 성상
- 가. 제형 : 생물학적제제
- 나. 성상 : 흰색의 유탁주사액으로 정지하면 약간의 침전층이 생기나 진탕하면 균일한 액체가 되며, 이물 및 이취가 없고 내용물의 성상이 균일하게 된.
- 효능 및 효과
- 달의 전염성기관자염, 뉴캐슬병 및 전염성 예프 (F)병의 예방
- 용법 및 용량
- 가. 접종시기 : 산란 3주전까지 접종
- 나. 접종방법 : 1수당 0.5ml를 접종계의 근육부위에 접종
- 포장단위
- 1,000수/병
- 저장방법 및 유효기간
- 가. 저장방법 : 냉장소 (2~8℃)에 보관
- 나. 용기종류 : 밀봉용기
- 다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월
- 주의사항
- 가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것
  - 1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지 마십시오.
  - 2) 질병에 감염되었거나 잠복중인 닭, 열이 있거나 영양장애가 심한 닭, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 닭, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

- 나. 부작용
  - 달의 위생상태에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 기침, 재채기, 산란을 저하 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.
- 다. 일반적 주의
  - 1) 달의 모체이행항체수준, 일령, 건강상태, 재접종 등의 조건에 따라 면역형성에 차이가 있으니 이를 고려하여 접종하십시오.
  - 2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
  - 3) 사용설명서 (주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
  - 4) 지정된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확인되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
  - 5) 접종시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
  - 6) 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장비를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.
  - 7) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
  - 8) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 ㈜중앙백신 연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

## 라. 적용상의 주의

- 1) 사용할 때마다 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- 2) 사용 전에 백신을 실은 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 3) 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 1수 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 4) 주사방법이 잘못되면 동통, 경결 및 화농이 생길 수 있습니다.
- 5) 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
- 6) 주사시 주사통중에 의해 접종자가 동물의 공격을 받을 수 있으므로 안전사고에 주의하십시오.

- 7) 각종 스트레스 요인 (환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.
- 8) 백신 접종시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.
- 9) 백신 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으로 소독하여 건조한 후 백신액을 뽑으며 주사기 혈관에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 10) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은 백신은 잡균의 혼입, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 11) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수 있어 즉시 백신액을 흡입하여 체외로 빼내야 합니다. 라벨, 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 외과의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받으십시오.

## 마. 저장상의 주의사항

- 1) 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.
- 2) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리하십시오.
- 5) 빈 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

## ○ 제조원

**중앙백신** 연구소

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37