

# 사용 설명서

캐니샷® 케이5<sup>주</sup>  
(CaniShot® K5)

## 1. 원료약품 및 분량(본제 1두분 중)

### 가. 유효성분

- 개 디스토펜바이러스(CDV, Rockborn) -----10<sup>3.5</sup>TCID<sub>50</sub> 이상
- 개 아데노바이러스 2형(CAV-2, Manhattan)-----10<sup>3.0</sup>TCID<sub>50</sub> 이상
- 개 파보바이러스(CPV, 780916-LP)-----10<sup>5.0</sup>TCID<sub>50</sub> 이상
- 개 파라인플루엔자바이러스(CPIV, D008) -----10<sup>4.0</sup>TCID<sub>50</sub> 이상

### 나. 첨가제

- 트레할로오스, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨, L-글루탐일나트륨, 젤라틴

## 2. 제형 및 성상

생물학적 제제, 회백색의 건조괴로서 이물, 이취가 없고 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

## 3. 효능 및 효과

개 디스토펜, 전염성간염(개 아데노바이러스 2형), 파보바이러스 및 파라인플루엔자 감염증의 예방

## 4. 용법 및 용량

캐니샷® 케이5를 동봉된 희석액 또는 캐니샷® 렘토 또는 캐니샷® 씨브이로 완전히 용해하여 사용한다.

### 가. 접종방법

- 1) 1차 접종 : 생후 6~7주령
- 2) 2차 접종 : 생후 8~9주령
- 3) 3차 접종 : 생후 11~14주령
- 4) 년 1회 보강접종

### 나. 주사부위 : 개 견갑부(어깨부분) 피하에 접종한다.

### 다. 접종량 : 1두분(1.0 ml)을 접종한다.

## 5. 포장단위

1두/병

## 6. 저장방법 및 유효기간

### 가. 저장방법 : 냉장소(2-8℃)에 보관

### 나. 용기종류: 밀봉용기

### 다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

## 7. 주의사항

### 가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

- 1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- 2) 열이 있거나 영양장애가 심한 동물, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 동물, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 동물에는 사용하지 마십시오.

### 나. 부작용

- 1) 개체에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 허탈, 피부발진, 구토, 경련 등의 과민반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 과민반응 시에는 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 피하주사 후 주사부위의 통증, 종창, 경결 등이 나타날 수 있으므로 주사 후 마사지를 충분히 해주십시오.

### 다. 일반적 주의

모건의 백신접종여부, 접종횟수, 감염여부에 따라 자견의 면역형성이 달라질 수 있으므로 이를 고려하여 접종하십시오.

### 라. 임신, 수유축, 신생축, 어린 가축, 쇠약축 등에 대한 투여

임신중인 개에 사용하지 마십시오

### 마. 적용상의 주의

- 1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 지정된 축종에 사용하십시오.
- 2) 사용할 때마다 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- 3) 사용 전에 백신을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 4) 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 5) 주사방법이 잘못되면 동통, 경결 및 화농이 생길 수 있습니다.
- 6) 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
- 7) 주사시 주사통증에 의해 접종자가 동물의 공격을 받을 수 있으므로 안전사고에 주의하십시오.
- 8) 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

### 바. 저장상의 주의사항

- 1) 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.
- 2) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리하십시오.
- 5) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

### 사. 기타

제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.

**중앙백신** 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

CI-155A-02